

5. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Симетиконовата емулсия съдържа 1 mg натриев бензоат на ml разтвор. Натриевият бензоат може да увеличи жълтеницата (пожълтяването на кожата и очите) при новородените бебета (до 4 седмична възраст)

6. Как да съхранявате DEGASIN® Baby и информация за срока на годност?

Съхранявайте този продукт на място, недостъпно за деца.

Не използвайте продукта след изтичане на срока на годност, обозначен на картонената кутия и етикета на бутилката. Срокът на годност е валиден до последния ден на посочения месец.

7. Съдържание на опаковката и друга информация

1 ml (около 33 капки) емулсия съдържа 66,6 mg симетикон.

Други съставки: лимонена киселина монохидрат, сорбинова киселина, карбоксиполиметилен, аромат малина, аромат ванилия, метилхидроксипропилцелулоза, захарин, натриев бензоат, натриев бикарбонат, натриев цитрат, пречистена вода.

Всеки сериозен инцидент във връзка с употребата на това медицинско изделие трябва да бъде докладван на производителя и на компетентния орган в Страната членка на ЕС по местоживее на потребителя/ пациента:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ №8, 1303 София

тел.: +3592 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Производител:

HÄLSA Pharma GmbH Maria-Goeppert-Straße 5 D-23562 Lübeck, Германия

Медицинско изделие

CE 0482

Дистрибутор:

Стада България ЕООД

ул.Атанас Дуков 29, Рейнбоу плаза ет.5, София 1407, България

тел. 02/920 90 65, e-mail: info@stada.bg, www.stada.bg

Дата на последна редакция на текста: 08.2023

9355297 2312 BG

2000634

Инструкции за употреба

Прочетете внимателно инструкциите, защото съдържат важна за Вас информация.

DEGASIN® Baby

66,6 mg/ml емулсия симетикон

Уважаеми клиенти,

На всеки се случва да изпитва неприятни или болезнени стомашно-чревни оплаквания, свързани с образуване на газове, като флатуленция или чувство на тежест. Това е нещо нормално и на първо време не е повод за притеснение, предвид колко сложен е процесът на храносмилане при хората. Въпреки това, тези симптоми могат да причинят голям дискомфорт.

Точно тук е мястото на DEGASIN® Baby , тъй като DEGASIN® Baby спомага да се преборите със стомашно-чревните проблеми бързо и надеждно.

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете прием на продукта, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Този продукт се предлага без рецепта. Винаги го приемайте така, както е описано в тази листовка.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате нужда от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят, моля свържете се с Вашия лекар.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява DEGASIN® Baby и за какво се използва?
2. Какво трябва да знаете преди да приемете DEGASIN® Baby?
3. Как да приемате DEGASIN® Baby?
4. Възможни нежелани реакции
5. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
6. Как да съхранявате DEGASIN® Baby и информация за срока на годност?
7. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява DEGASIN® Baby и за какво се използва?

Това медицинско изделие съдържа симетикон, който премахва и предотвратява образуването на пяна.

DEGASIN® Baby се използва:

- за облекчение и симптоматично лечение на стомашно-чревни оплаквания, свързани с образуване на газове, като флатуленция (метеоризъм), чувство на тежест, болезнени коремни спазми, болка в горната част на корема, уригване, функционална диспепсия, синдром на раздразнено черво и постоперативна болка, свързана с газове
- за подготовка за диагностични изследвания в коремната област като ендоскопия, рентген и сонография.
- за симптоматично лечение на бебешки колики
- като спешна мярка в случай на поглъщане и натравяне с течни сапуни (сърфактанти).

2. Какво трябва да знаете преди да приемете DEGASIN® Baby?

Не трябва да приемате DEGASIN® Baby, ако стесвърхчувствителни (алергични) към симетикон или някоя от останалите съставки на DEGASIN® Baby.

В случай, че изпитвате наскоро- появил се и/или продължителен коремен дискомфорт, трябва да се консултирате с лекар, за да бъде установена причината за оплакването и да се установи всяко възможно скрито заболяване, което изисква лечение.

Бременност и кърмене

Няма ограничения за приема на DEGASIN® Baby по време на бременност и кърмене.

Употреба при деца

DEGASIN® Baby емулсия може да бъде използвана за симптоматично лечение на стомашно-чревни оплаквания, свързани с газове при деца под 6 години и бебета.

Взаимодействие с други вещества

Няма известни клинично значими взаимодействия.

3. Как да приемате DEGASIN® Baby?

Винаги приемайте DEGASIN® Baby точно, както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Освен, ако Вашият лекар не е предписал друго, препоръчителният прием на DEGASIN® Baby е:

При стомашно-чревни оплаквания, свързани с газове:

Кърмачета и бебета на адаптирано мляко

10-20 капки (0,3 - 0,6 ml) DEGASIN® Baby се добавят към всяка бутилка. DEGASIN® Baby се смесва лесно с други течности напр. мляко.

За кърмени бебета, DEGASIN® Baby може да бъде приеман преди всяко хранене с малка лъжичка.

Малки деца (1-6 г)

Малките деца могат да приемат 20 капки от DEGASIN® Baby по време на или след хранене.

Ако е необходимо, могат да приемат още 20 капки DEGASIN® Baby преди лягане.

Деца в училищна възраст и възрастни:

Деца в училищна възраст: 30 до 40 капки (0,9 до 1,2 ml)

Възрастни: 40 до 60 капки (1,2 до 1,8 ml)

Тази доза трябва да се повтаря на всеки 4 до 6 часа и може да бъде увеличена, ако е необходимо. DEGASIN® Baby може да се приема по време на или след хранене, както и преди лягане при необходимост.

Бутилката трябва да бъде разклатена добре преди употреба! За да се отделят капките, дръжте бутилката вертикално надолу и леко потупвайте с пръст дъното на бутилка. Ако дръжките бутилката наклонена под ъгъл, скоростта, с която капките се отделят може да намалее.

DEGASIN® Baby емулсия може да бъде приеман продължително време, ако е необходимо. Но за да се избегне риска от маскиране на съпътстващо клинично състояние, DEGASIN® Baby не трябва да бъде приеман повече от 4 седмици без консултация с лекар.

При подготовка за образни изследвания

Най-добре е приемът в следните случаи да се осъществи след отстраняване на капкомера от бутилката.

Възрастни и деца от 6-годишна възраст: 1-2 чаени лъжици (5-10 ml) DEGASIN® Baby в деня преди изследването и 1 чаена лъжица (5 ml) на сутринта на изследването след консултация с лекуващия лекар.

Отравяне с измиващи препарати

В случай на иотравяне с измиващи препарати, дозировката зависи от степента на отравяне. Като минимална доза се препоръчва 1 чаена лъжица (5 ml) DEGASIN® Baby.

Какво трябва да направите, ако сте приели повече DEGASIN® Baby от необходимото?

Дори големи количества от DEGASIN® Baby се понасят лесно, т.к. активната съставка на емулсията оказва само физичен ефект и е биологично и химично напълно неактивна.

Какво трябва да направите, ако сте пропуснали да приемете DEGASIN® Baby?

Ако сте пропуснали да приемете DEGASIN® Baby, продължете лечението, без да промените дозата.

4. Възможни нежелани реакции

Не са наблюдавани нежелани реакции, свързани с приема на DEGASIN® Baby.

Активното вещество симетикон, която се съдържа в продукта DEGASIN® Baby, разтваря пяната в стомашно-чревния тракт по чисто физичен път и е химично и биологично напълно неактивна.

Ако все пак забележите някакви нежелани реакции, моля съобщете ги на своя лекар или фармацевт.

STADA

Produkt/Product: DEGASIN BABY 66.6MG EMU SD BG:PIL
STADA Mat.-Nr./Mat.-No.: 9355297 DZ: 2312
STADA Art.-Nr./Art.-No.: 179320
Hersteller/Manufacturer: Cosmo Spa
Hersteller Art.-Nr./ Manufacturer Art.-No.: 2000634
Format/Size: 300 x 187 mm
Schriftgröße/Font-size: 9-30 pt
NTIN/GTIN: -
PZN/EAN: -
Pharma-Code: 33
Flattermarke/Collating mark: -
1. Farbe/Colour: ■ Black
2. Farbe/Colour: -
3. Farbe/Colour: -
4. Farbe/Colour: -
5. Farbe/Colour: -
6. Farbe/Colour: -
7. Farbe/Colour: -
8. Farbe/Colour: -
Version: 2.Loop Datum/Date: 08.02.2024
Agentur/Agency: STADA Agency
Grafik erstellt von/Graphic made by: N.V.
Aktueller Umlauf/Current loop: N.V.
Genehmigt/Approved